

Afta[®] med



Spécialité dentaire

Traitement avancé des lésions buccales dont les aphtes
Soulage immédiatement la douleur et favorise la cicatrisation



Une double action :

- Filmogène avec l'acide hyaluronique
- Muco-adhésif avec la matrice (polymère) bio-adhésive

- ✓ Enfants dès 3 ans
- ✓ Peut être utilisé par les diabétiques, femmes enceintes
- ✓ Sans alcool (ne pique pas, n'irrite pas)
- ✓ pH neutre
- ✓ Sans conservateur, sans colorant, sans sucre
- ✓ Sans danger en cas d'ingestion
- ✓ Peut être utilisé quotidiennement chez les patients à risque



3 rue des Batignolles
75017 Paris

Tél : 09 87 75 25 77

contact@bipharma.eu

<http://bipharma.net/eshop>

Afta[®] med



**Gamme complète à base d'acide hyaluronique
de haut poids moléculaire**

Gel adulte & junior 15 ml (240 mg/ 100 g)



ACL : 6010767
EAN : 3401360107670
ACL : 6010770
EAN : 3401360107700

Application 2 à 3 fois par jour ou plus si besoin pendant 1 semaine jusqu'à disparition des symptômes.

- Gel adulte : goût menthe-anis
- Gel junior : goût bubble-gum

Shield 8 ml (600 mg/ 100 g)



ACL : 6112760
EAN : 3770011708000

Formule à haute intensité :

Déposer une quantité appropriée de gel sur la lésion. En cas de grande lésion, s'assurer que la surface complète soit traitée. Appliquer 2 à 3 fois par jour (plus si nécessaire) jusqu'à disparition des symptômes.

Spray 20 ml (30 mg/ 100 g)



ACL : 6012333
EAN : 3401360123335

Application 2 à 3 fois par jour, ou plus si besoin pendant 1 semaine jusqu'à disparition des symptômes.

Bain de bouche 150 ml (25 mg/ 100 g)



ACL : 6010768
EAN : 3401360107687

Effectuer un bain de bouche de 10 ml 2 fois par jour, ou plus si besoin après les repas pendant 1 semaine jusqu'à disparition des symptômes. Le bain de bouche est prêt à l'emploi et ne se dilue pas.